

1. Dérivées

E.7003    Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 3 \cdot x - x \cdot \ln x$$

On admet que f est dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$ et on désigne par f' sa fonction dérivée.

Parmi les trois réponses ci-dessous, laquelle est exacte?

- ☐ a $f'(x) = 3 - \frac{1}{x}$ ☐ b $f'(x) = 3 - \ln x$
☐ c $f'(x) = 2 - \ln x$

E.7009    On note g la fonction définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = (x+1) \cdot \ln(x)$$

Parmi les réponses ci-dessous, laquelle est correcte?

- ☐ a $g'(x) = \frac{1}{x}$ ☐ b $g'(x) = 1 + \ln(x)$
☐ c $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$ ☐ d $g'(x) = 1 + \frac{1}{x} + \ln(x)$

E.7392   

Parmi les quatre réponses proposées, une seule est exacte. Préciser laquelle en justifiant votre réponse.

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x \cdot \ln(x) - x$$

On note f' sa fonction dérivée.

On a alors :

- ☐ a $f'(x) = 0$ ☐ b $f'(x) = \ln(x)$
☐ c $f'(x) = \frac{1}{x} - 1$ ☐ d $f'(x) = \frac{1}{x} - x$

E.7745   Parmi les quatre propositions, une seule est exacte. La réponse doit être justifiée :

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ et f' sa fonction dérivée. On a :

- ☐ a $f'(x) = \frac{\ln(x) - 1}{x^2}$ ☐ b $f'(x) = \frac{1 - \ln(x)}{x^2}$
☐ c $f'(x) = \frac{1}{x^2}$ ☐ d $f'(x) = \frac{1 + \ln(x)}{x^2}$

2. Etude de fonctions

E.7646  


E.7023   

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée. Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point

Soit la fonction f définie pour tout réel x strictement positif par :

$$f(x) = 5 - x + 2 \cdot \ln x$$

On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f , ainsi que T , la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 4.



1 On note f' la fonction dérivée de f , on a :

- ☐ a $f'(x) = -1 + 2x$ ☐ b $f'(x) = -2 \cdot \ln x + (5-x) \cdot \frac{2}{x}$
☐ c $f'(x) = \frac{-x+2}{x}$ ☐ d $f'(x) = 4 + \frac{2}{x}$

2 Une équation de T est :

- ☐ a $y = \frac{1}{2} \cdot x + 5,7$ ☐ b $y = 5,7 \cdot x - \frac{1}{2}$
☐ c $y = -\frac{1}{2} \cdot x + 1 + 2 \cdot \ln 4$ ☐ d $y = -\frac{1}{2} \cdot x + 3 + 2 \cdot \ln 4$

Définition -proposition : la fonction **logarithme népérien**, notée $\ln$ est définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ et admet le tableau de variations :

x	0	1	e	$+\infty$
Variation de f	$-\infty$	0	1	$+\infty$

De plus, sa fonction dérivée a pour expression :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

- ① Dresser le tableau de signes de la fonction logarithme népérien.
- ② On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :
 $f(x) = x - \ln(x)$
 - a) Déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f .
 - b) Établir le tableau de signes de la fonction f'
 - c) Préciser les sens de variations de la fonction f sur $]0; +\infty[$.

E.7029



Indication : pour chacune des cinq affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Il est attribué un point par réponse exacte correctement justifiée. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte. Une absence de réponse n'est pas pénalisée.

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x \cdot \ln x - x + 1$$

- **Affirmation 1 :**
La fonction f est croissante sur l'intervalle $]0; 1]$.
- **Affirmation 2 :**
La fonction f est convexe sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
- **Affirmation 3 :**
Pour tout x appartenant à l'intervalle $]0; +\infty[$:
 $f(x) \leq 50$

E.7433



On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0; 10]$ par :


$$f(x) = -x \cdot \ln x + 2 \cdot x + 1$$

- ① Calculer $f'(x)$.
- ② Démontrer que la fonction f admet un maximum sur l'intervalle $]0; 10]$.
- ③ Calculer la valeur exacte du maximum de la fonction f sur ce même intervalle.

E.7019 On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0; 1,5]$ par :

$$f(x) = 9x^2 \cdot (1 - 2 \cdot \ln x) + 10$$

La courbe représentative de f est donnée ci-dessous :



- ① Montrer que $f'(x) = -36 \cdot x \cdot \ln x$ où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $]0; 1,5]$.
- ② Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $]0; 1,5]$.
- ③ Dédire de la question précédente les variations de la fonction f sur l'intervalle $]0; 1,5]$.

3. Théorème des valeurs intermédiaires

E.7441



Une entreprise produit et vend des composants électroniques. Sa capacité mensuelle de production est comprise entre 1 000 et 30 000 pièces. On suppose que toute la production est commercialisée.

Le bénéfice en milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x milliers de pièces, est donné sur l'intervalle $[1; 30]$ par :

$$B(x) = -0,5 \cdot x^2 + 6 \cdot x - 20 + 2x \cdot \ln x$$

- ① Montrer que : $B'(x) = -x + 8 + 2 \cdot \ln x$ où B' est la dérivée de B sur l'intervalle $[1; 30]$.
- ② On admet que $B''(x) = -1 + \frac{2}{x}$, où B'' est la dérivée seconde de B sur l'intervalle $[1; 30]$. Justifier le tableau de variations ci-dessous de la fonction dérivée B' sur l'intervalle $[1; 30]$.

x	1	2	30
Variation de $B'(x)$	7	$6 + 2 \ln 2$	$-22 + 2 \ln 30$

- ③ a) Montrer que l'équation $B'(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[1; 30]$.
 b) Donner une valeur approchée au millièm de la valeur de α .
- ④ En déduire le signe de $B'(x)$ sur l'intervalle $[1; 30]$, et donner le tableau de variations de la fonction bénéfice B sur ce même intervalle.
- ⑤ Quel est le nombre de pièces à produire, à l'unité près, pour que l'entreprise réalise un bénéfice maximal ? Quel est ce bénéfice maximal (arrondi au millier d'euros) ?

E.7434    On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[1; 10]$ par :

$$f(x) = 4 \cdot e^{-0,5 \cdot x + 1} + x - 1$$

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[1; 10]$ et on note f' sa fonction dérivée.

- ① Démontrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle $[1; 10]$, on a :

$$f'(x) = -2 \cdot e^{-0,5 \cdot x + 1} + 1$$

- ② a) Montrer que sur l'intervalle $[1; 10]$, l'équation $f'(x) = 0$ admet pour unique solution le nombre :
 $\alpha = 2 + 2 \cdot \ln 2$
- b) On admet que l'ensemble des solutions sur l'intervalle $[1; 10]$ de l'inéquation $f'(x) \geq 0$ est $[2 + 2 \cdot \ln 2; 10]$.
 En déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle $[1; 10]$.

4. Propriétés algébriques

E.7701    Une seule des réponses proposées est exacte.

Aucune justification n'est demandée.

La valeur exacte de $\ln(10 \cdot e^2)$ est :

- a) $2 \cdot \ln(10) + 2$ b) $4,302\,585\,093$
 c) $\ln(10) + 2$ d) $2 \cdot \ln(10 \cdot e)$

E.7697    Déterminer si la proposition est vraie ou fausse et justifier la réponse :

Proposition : on a l'égalité : $e^{5 \cdot \ln 2} \times e^{7 \cdot \ln 4} = 2^{19}$

E.7744    Parmi les quatre propositions, une seule est exacte. Recopier la proposition exacte sans justification :

Pour tout réel $x < 0$, le nombre réel $\ln\left(-\frac{1}{x}\right)$ est égal à :

- a) $\ln(x)$ b) $-\ln(-x)$ c) $-\ln(x)$ d) $\frac{1}{\ln(x)}$

E.7846    Dire si l'affirmation ci-dessous est vraie ou fausse. Justifier la réponse donnée.

Pour tout réel a strictement positif :
 $\ln(a^3) - \ln(a^2) = \ln(a^{25}) - \ln(a^{24})$

5. Résolution d'équations

E.7519   

Parmi les quatre propositions ci-dessous, une seule est correcte. Laquelle ?

La solution de l'équation $x^{23} = 92$ est égale à :

- a) 4 b) 1,2 c) $e^{\frac{\ln(92)}{23}}$ d) $e^{\frac{\ln(23)}{92}}$

E.7693    On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[1; 10]$ par :

$$f(x) = 4 \cdot e^{-0,5 \cdot x + 1} + x - 1$$

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle

$[1; 10]$ et on note f' sa fonction dérivée.

- ① Démontrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle $[1; 10]$, on a : $f'(x) = -2 \cdot e^{-0,5 \cdot x + 1} + 1$.
- ② Montrer que sur l'intervalle $[1; 10]$, l'équation $f'(x) = 0$ admet pour unique solution le nombre $\alpha = 2 + 2 \cdot \ln 2$.

E.7847    Dire si l'affirmation ci-dessous est vraie ou fausse. Justifier la réponse donnée.

L'équation $x \cdot \ln(x) = 2 \cdot \ln(x)$ admet exactement deux solutions 2 et 1 sur $]0; +\infty[$.

6. Résolution d'équations et propriétés algébriques

E.7692   

Parmi les quatre propositions ci-dessous, une seule est correcte. Laquelle ?


La solution exacte de l'équation $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{3}{10}$ est :

- a) 1,74 b) $\frac{\ln(10) - \ln(3)}{\ln(2)}$ c) $-\frac{\ln(3)}{\ln(5)}$ d) 0,5

7. Résolution d'inéquations : graphiquement

E.7053    La courbe ($\mathcal{C}$) ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f définie et dérivable

sur l'intervalle $[-1; 2]$.



On note f' la fonction dérivée de la fonction f .

Le point G a pour coordonnées $(0; 2)$.

Le point H a pour coordonnées $(1; 3)$.

La droite (GH) est la tangente à la courbe $(\mathcal{C})$ au point G .

La courbe $(\mathcal{C})$ admet une tangente horizontale au point S d'abscisse $\ln 2$.

Aucune justification n'est demandée. Par lecture graphique :

- ① Donner les valeurs de $f(0)$ et $f'(0)$.
- ② Résoudre sur $[-1; 2]$ l'inéquation $f'(x) \leq 0$.

8. Résolution d'inéquations

E.7698 Justifier que l'inéquation $1 - e^{x^2-1} \geq 0$ a pour ensemble de solutions l'intervalle $[-1; 1]$.

E.7691 Résoudre dans $[0; 10]$ l'inéquation :
 $100 \cdot e^{-x} - 0,5 \geq 0$

E.7045 Parmi les quatre propositions ci-dessous, laquelle est vraie?

Les nombres entiers n solutions de l'inéquation $\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,003$ sont tous les nombres entiers n tels que :

- (a) $n \geq 8$ (b) $n \geq 9$
 (c) $n \leq 8$ (d) $n \leq 9$

E.7210 Dans une exploration forestière, les arbres coupés dans cette forêt sont utilisés pour le chauffage. Le prix d'un stère de bois (*unité de volume mesurant le bois*) augmente chaque année de 3%.

Au bout de combien d'années le prix d'un stère de bois aura-t-il doublé?

E.7034

Rappel : $\mathbb{N}$ est l'ensemble des entiers naturels.

Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation :
 $12\,000 - 2\,000 \times 0,75^n \geq 11\,950$

E.7424

Parmi les quatre réponses proposées, une seule est exacte. Préciser laquelle en justifiant votre réponse.

Les entiers naturels n vérifiant l'inéquation :

$$6 \times 0,95^n - 1 \leq 2$$

appartiennent à l'intervalle :

- (a) $]-\infty; \frac{\ln 3}{\ln(5,7)}]$ (b) $]-\infty; \ln\left(\frac{0,5}{0,95}\right)]$
 (c) $]-\infty; \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,95)}]$ (d) $\left[\frac{\ln(0,5)}{\ln(0,95)}; +\infty[$

E.7746 On considère la suite (u_n) dont les termes sont définies pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 700 - 100 \times 0,7^n$$

- ① Soit n un entier naturel. Démontrer que $u_n \geq 697$ est équivalent à $0,7^n \leq 0,03$.
- ② Pour résoudre cette inéquation, on utilise l'algorithme suivant :

```

N ← 0
U ← 1
Tant que U > 0;03
  N ← N+1
  U ← 0;7 × U
Fint Tant que
  
```

Donner la valeur de la variable N à la fin de l'exécution de cet algorithme.

- ③ Retrouver ce résultat en résolvant l'inéquation :
 $0,7^n \leq 0,03$.

9. Résolution d'inéquations et étude de fonctions

E.7014    Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[3; 13]$ par :

$$f(x) = -2x + 20 - e^{-2x+10}$$

- 1 Montrer que la fonction dérivée f' , de la fonction f , définie pour tout x de l'intervalle $[3; 13]$, a pour expression :

$$f'(x) = 2 \cdot (-1 + e^{-2x+10})$$

- 2 a Résoudre dans l'intervalle $[3; 13]$ l'inéquation : $f'(x) \geq 0$
- b En déduire le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[3; 13]$ et dresser le tableau de variations de f sur cet intervalle. Les valeurs du tableau seront, si besoin, arrondies à 10^{-3} .

E.7694    On considère la fonction g définie

sur l'intervalle $[1; 45]$ par :

$$g(x) = -20 \cdot x + 5 \cdot x \cdot \ln(x) + 30$$

- 1 a On note g' la fonction dérivée de la fonction g .
Montrer que, pour tout x appartenant à $[1; 45]$, on a : $g'(x) = -15 + 5 \cdot \ln(x)$
- b Montrer que l'inéquation $-15 + 5 \cdot \ln(x) \geq 0$ est équivalent à $x \geq e^3$.
- c Dresser le tableau de variations de la fonction g (les valeurs seront arrondies au centième si besoin).
- 2 a Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur l'intervalle $[1; 45]$.
- b Donner un encadrement de α d'amplitude 0,01.
- c En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x dans l'intervalle $[1; 45]$.

10. Résolution d'inéquations et suites

E.7700    On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par la relation :

$$u_n = -17,5 \times 0,92^n + 37,5$$

- 1 Déterminer les deux premiers termes de cette suite.
- 2 Déterminer la limite de la suite (u_n) .
- 3 Les termes de la suite (u_n) dépasseront-ils la valeur 30? Si oui, pour quel rang la première fois cette valeur sera-t-elle dépassée?

E.7699    On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par : $u_n = 2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

On admet que la suite (u_n) est décroissante.

- 1 Déterminer la limite de la suite (u_n) .
- 2 On considère l'algorithme suivant :

```

n ← 0
u ← 5
Tant que u - 2 ≥ 10-6
    n ← n + 1
    u ← 2 + 3 · (1/2)n
Fin tant que
    
```

Déterminer la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de cet algorithme.

11. Problèmes

E.7747    Une entreprise qui produit du papier recyclé, a été créée en l'an 2000 et le tableau ci-dessous donne l'évolution de sa production.

Année	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012
Rang de l'année	0	2	4	6	8	10	12
Production en tonnes	7 000	18 811	36 620	49 000	58 012	63 098	68 500

- 1 a Déterminer le pourcentage d'augmentation de la production entre les années 2000 et 2012. On donnera le résultat arrondi sous la forme $a\%$ où a est un nombre entier.
- b Déterminer un nombre réel positif qui est solution de l'équation : $x^{12} = 9,79$. Interpréter ce nombre en termes de taux d'évolution de la production de cette en-

treprise entre les années 2000 et 2012. On donnera le résultat arrondi sous la forme $b\%$ où b est un nombre entier.

- 2 L'entreprise fait appel à un cabinet d'experts pour modéliser l'évolution de la production de l'entreprise afin de faire une projection jusqu'en 2020. Le cabinet d'experts propose la fonction f définie sur l'intervalle $[2; 20]$ par :
- $$f(x) = 27\,131 \cdot \ln(x) + 0,626 \cdot x^3$$
- où x représente le rang de l'année et $f(x)$ le nombre de tonnes produites.
- a On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $[2; 20]$. Déterminer $f'(x)$ puis les variations de la fonction f sur $[2; 20]$.
- b À l'aide de cette modélisation, l'entreprise peut-elle dépasser une production de 90 000 tonnes de papier recyclé avant l'année 2020? Justifier.