

1. Algèbre

E.3190



Partie A. Restitution organisée de connaissances

Prérequis : On rappelle les deux résultats suivants :

- Si z est un nombre complexe non nul, on a l'équivalence suivante :

$$\begin{cases} |z| = r \\ \arg z = \theta \text{ à } 2\pi \text{ près} \end{cases} \iff \begin{cases} z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ r > 0 \end{cases}$$

- Pour tous nombres réels a et b :

$$\begin{cases} \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ \sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a \end{cases}$$

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes non nuls.

Démontrer les relations :

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \quad ; \quad \arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2) \text{ à } 2\pi \text{ près.}$$

Partie B

Pour chaque proposition, indiquer si elle est vraie ou fausse et proposer une démonstration pour la réponse indiquée. Dans le cas d'une proposition fausse, la démonstration consistera à fournir un contre-exemple. Une réponse sans démonstration ne rapporte pas de point.

On rappelle que si z est un nombre complexe, $\bar{z}$ désigne le conjugué de z et $|z|$ désigne le module de z :

1 Si $z = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$, alors z^4 est un nombre réel.

2 Si $z + \bar{z} = 0$, alors $z = 0$.

3 Si $z + \frac{1}{z} = 0$, alors $z = i$ ou $z = -i$.

4 Si $|z| = 1$ et si $|z + z'| = 1$, alors $z' = 0$.

E.6260



On désigne par (E) l'équation $z^4 + 4z^2 + 16 = 0$ d'inconnue complexe z .

1 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^2 + 4Z + 16 = 0$.
écrire les solutions de cette équation sous une forme exponentielle.

2 On désigne par a le nombre complexe dont le module est égal à 2 et dont un argument est égal à $\frac{\pi}{3}$.

Calculer a^2 sous forme algébrique.

En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation :

$$z^2 = -2 + 2i\sqrt{3}.$$

On écrira les solutions sous forme algébrique.

3 Restitution organisée de connaissances

On suppose connu le fait que pour tout nombre complexe $z = x + iy$ où $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$, le conjugué de z est le nombre complexe $\bar{z}$ défini par $\bar{z} = x - iy$.

Démontrer que :

- Pour tous nombres complexes z_1 et z_2 , $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$.

- Pour tout nombre complexe z et tout entier naturel non nul n : $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$.

- 4 Démontrer que si z est une solution de l'équation (E) alors son conjugué $\bar{z}$ est également une solution de (E) . En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E) . On admettra que (E) admet au plus quatre solutions.

E.3122



Le plan (P) est muni du repère orthonormé direct $(O; I; J)$ (unité graphique : 2 cm). À tout point M du plan (P) est associé le nombre complexe z , affixe du point M .

- 1 a Déterminer le module et un argument de chacun des nombres complexes :

$$z_1 = -1 \quad ; \quad z_2 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \quad ; \quad z_3 = -1 - i\sqrt{3}.$$

- b Déterminer le module et un argument de chacun des cubes z_1^3 , z_2^3 , z_3^3 des nombres complexes ci-dessus, puis la partie réelle et la partie imaginaire de z_1^3 , de z_2^3 , de z_3^3 .

- 2 a Si $z = x + iy = \rho \cdot e^{i\theta}$ est un nombre complexe (avec y et θ réels et ρ réel supérieur à zéro), déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z^3 en fonction de x et de y , puis le module et un argument de z^3 en fonction de ρ et θ .

- b Déterminer l'ensemble (E) des points M d'affixe z caractérisé par : z^3 est un nombre réel.

- c Déterminer et tracer l'ensemble (E') des points M d'affixe z , caractérisé par : z^3 est un nombre réel et $1 \leq z^3 \leq 8$.

E.5949



Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On note $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes.

Pour chacune des propositions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

- 1 **Proposition :** Pour tout entier naturel n :
 $(1 + i)^{4n} = (-4)^n$

- 2 Soit (E) l'équation $(z - 4)(z^2 - 4z + 8) = 0$ où z désigne un nombre complexe.

Proposition : Les points dont les affixes sont les solutions, dans $\mathbb{C}$, de (E) sont les sommets d'un triangle d'aire 8.

- 3 **Proposition :**
Pour tout nombre réel α : $1 + e^{2i\alpha} = 2 \cdot e^{i\alpha} \cdot \cos(\alpha)$.

- 4 Soit A le point d'affixe $z_A = \frac{1}{2} \cdot (1 + i)$ et M_n le point d'affixe $(z_A)^n$ où n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Proposition : si $n - 1$ est divisible par 4, alors les points O , A et M_n sont alignés.

- 5 Soit j le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{2\pi}{3}$.

Proposition : $1 + j + j^2 = 0$

2. Géométrie sans les propriétés de l'argument

E.5430



Le plan complexe est muni d'un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct.

On note i le nombre complexe tel que : $i^2 = -1$.

Soit A le point d'affixe $z_A = 1$ et B le point d'affixe $z_B = i$.

À tout point M d'affixe $z_M = x + iy$, avec x et y deux réels tels que $y \neq 0$, on associe le point M' d'affixe :

$$z_{M'} = -i \cdot z_M$$

On désigne par I le milieu du segment $[AM]$.

Le but de l'exercice est de montrer que pour tout point M n'appartient pas à (OA) , la médiane (OI) du triangle OAM est aussi une hauteur du triangle OBM' (propriété 1) et que $BM' = 2 \cdot OI$ (propriété 2).

- 1 Dans cette question et uniquement dans cette question, on prend : $z_M = 2 \cdot e^{-i\frac{\pi}{3}}$.
 - a Déterminer la forme algébrique de z_M .
 - b Montrer que $z_{M'} = -\sqrt{3} - i$. Déterminer le module et un argument de $z_{M'}$.
 - c Placer les points A, B, M, M' et I dans le repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ en prenant 2 cm pour unité graphique. Tracer la droite (OI) et vérifier rapidement les propriétés 1 et 2 à l'aide du graphique.
- 2 On revient au cas général en prenant $z_M = x + iy$ avec $y \neq 0$.
 - a Déterminer l'affixe du point I en fonction de x et y .
 - b Déterminer l'affixe du point M' en fonction de x et y .
 - c Écrire les coordonnées des points I, B et M' .
 - d Montrer que la droite (OI) est une hauteur du triangle OBM' .
 - e Montrer que : $BM' = 2 \cdot OI$.

E.6262



On note $\mathbb{C}$ l'ensemble des nombres complexes.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On prendra comme unité 2 cm sur chaque axe. Le graphique sera fait sur une feuille de papier millimétré et complété au fur et à mesure des questions.

On considère la fonction f qui à tout nombre complexe z associe :

$$f(z) = z^2 + 2 \cdot z + 9$$

- 1 Calculer l'image de $-1 + i \cdot \sqrt{3}$.
- 2 Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $f(z) = 5$.
Écrire sous forme exponentielle les solutions de cette équation.
Construire alors sur le graphique, à la règle et au compas, les points A et B dont l'affixe est solution de l'équation (A étant le point dont l'affixe a une partie imaginaire positive).
On laissera les traits de construction apparents.
- 3 Soit λ un nombre réel. On considère l'équation $f(z) = \lambda$ d'inconnue z .
Déterminer l'ensemble des valeurs de λ pour lesquelles l'équation $f(z) = \lambda$ admet deux solutions complexes conjuguées.
- 4 Soit (F) l'ensemble des points du plan complexe dont l'affixe z vérifie : $|f(z) - 8| = 3$.
Prouver que (F) est le cercle de centre $\Omega(-1; 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.
Tracer (F) sur le graphique.
- 5 Soit z un nombre complexe, tel que $z = x + i \cdot y$ où x et y sont des nombres réels.
 - a Montrer que la forme algébrique de $f(z)$ est : $(x^2 - y^2 + 2 \cdot x + 9) + i \cdot (2 \cdot x \cdot y + 2 \cdot y)$.
 - b On note (E) l'ensemble des points du plan complexe dont l'affixe z est telle que $f(z)$ soit un nombre réel. Montrer que (E) est la réunion de deux droites D_1 et D_2 dont on précisera les équations. Compléter le graphique de l'annexe en traçant ces droites.
- 6 Déterminer les coordonnées des points d'intersection des ensembles (E) et (F) .

E.6778



Le plan complexe est rapporté à un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct.

On considère le point A d'affixe 4, le point d'affixe $4 \cdot i$ et les points C et D tels que $ABCD$ est un carré de centre O . Pour tout entier naturel non-nul n , on appelle M_n le point d'affixe : $z_n = (1 + i)^n$.

- 1 Écrire le nombre $1 + i$ sous forme exponentielle.
- 2 Montrer qu'il existe un entier naturel n_0 , que l'on précisera, tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, le point M_n est à l'extérieur du carré $ABCD$.

E.6779    On munit le plan complexe d'un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct.

On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des points M du plan d'affixe z tels que : $|z-2|=1$

- 1 Justifier que $\mathcal{C}$ est un cercle, dont on précisera le centre et le rayon.
- 2 Soit a un nombre réel. On appelle $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y=a \cdot x$.
Déterminer le nombre de points d'intersection entre $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ en fonction des valeurs de a .

E.3131    Dans le plan complexe muni du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points M et M' d'affixes respectives z et z' . On pose :

$$\begin{cases} z = x + i \cdot y \\ z' = x' + i \cdot y' \end{cases} \quad \text{où } x, x', y, y' \text{ sont des nombres réels.}$$

On rappelle que $\bar{z}$ désigne le conjugué de z et que $|z|$ désigne le module de z .

- 1 Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{OM'}$ sont orthogonaux si, et seulement si, $\operatorname{Re}(z' \cdot \bar{z}) = 0$.
- 2 Montrer que les points O, M et M' sont alignés si, et seulement si, $\operatorname{Im}(z' \cdot \bar{z}) = 0$.

Applications

- 3 N est le point d'affixe $z^2 - 1$. Quel est l'ensemble des points M tels que les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$ soient orthogonaux?
- 4 On suppose z non nul. P est le point d'affixe $\frac{1}{z^2} - 1$.
On recherche l'ensemble des points M d'affixe z tels que les points O, N et P soient alignés.
 - a Montrer que : $\left(\frac{1}{z^2} - 1\right) \overline{(z^2 - 1)} = -\bar{z}^2 \cdot \left|\frac{1}{z^2} - 1\right|^2$.
 - b En utilisant l'équivalence démontrée au début de l'exercice, conclure sur l'ensemble recherché.

3. Géométrie avec argument

E.3157    Pour chacune des 3 questions, une seule des trois propositions est exacte.

Le candidat indiquera sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse exacte rapporte 1 point ; une réponse inexacte enlève 0,5 point ; l'absence de réponse est comptée 0 point.

Si le total est négatif, la note est ramenée à zéro.

Dans tout l'exercice, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$

- 1 Le point M est situé sur le cercle de centre $A(-2; 5)$ et de rayon $\sqrt{3}$. Son affixe z vérifie :
 - a $|z - 2 + 5 \cdot i|^2 = 3$;
 - b $|z + 2 - 5 \cdot i|^2 = 3$;
 - c $|z - 2 + 5 \cdot i|^2 = 3$.

E.6777    Le plan est muni du repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On donne le nombre complexe : $j = -\frac{1}{2} + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$

Le but de cet exercice est d'étudier quelques propriétés du nombre j et de mettre en évidence un lien de ce nombre avec les triangles équilatéraux.

Partie A : propriétés du nombre j

- 1 a Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation :
 $z^2 + z + 1 = 0$
- b Vérifier que le nombre complexe j est une solution de cette équation.
- 2 Déterminer le module et un argument du nombre complexe j , puis donner sa forme exponentielle.
- 3 Démontrer les égalités suivantes :
 - a $j^3 = 1$
 - b $j^2 = -1 - j$
- 4 On note P, Q, R les images respectives des nombres complexes $1, j$ et j^2 dans le plan.
Quelle est la nature du triangle PQR ? Justifier la réponse.

Partie B

Soit a, b, c trois nombres complexes vérifiant l'égalité :

$$a + j \cdot b + j^2 \cdot c = 0$$

On nota A, B, C les images respectives des nombres a, b, c dans le plan.

- 1 En utilisant la question A 3 b, démontrer l'égalité :
 $a - c = j \cdot (c - b)$
- 2 En déduire que : $AC = BC$
- 3 Démontrer l'égalité : $a - b = j^2 \cdot (b - c)$
- 4 En déduire que le triangle ABC est équilatéral.

- 2 On considère trois points A, B et C d'affixes respectives a, b et c , deux à deux distincts et tels que le triangle ABC ne soit pas équilatéral. Le point M est un point dont l'affixe z est telle que les nombres complexes $\frac{z-b}{c-a}$ et $\frac{z-c}{b-a}$ sont imaginaires purs.
 - a M est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC ;
 - b M appartient aux cercles de diamètres respectifs $[AC]$ et $[AB]$;
 - c M est l'orthocentre du triangle ABC .
- 3 Soit A et B les points d'affixes respectives $1+i$ et $5+4 \cdot i$, et C un point du cercle de diamètre $[AB]$. On appelle G l'isobarycentre des points A, B et C et on note z_G son affixe.
 - a $|z_G - 3 - 2,5 \cdot i| = \frac{5}{6}$;
 - b $z_G - (1+i) = \frac{1}{3} \cdot (4+3 \cdot i)$;

(c) $z_G - (3 + 2,5i) = \frac{1}{3} \cdot (4 + 3i)$

E.3852    Pour chaque question, une seule des trois propositions est exacte. Le candidat indiquera sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Une réponse exacte rapporte 0,5 point ; une réponse inexacte enlève 0,25 point ; l'absence de réponse est comptée 0 point. Sit le total est négatif, la note est ramenée à zéro.

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct d'origine O .

- (1) Une solution de l'équation $2z + \bar{z} = 9 + i$ est :
 (a) 3 (b) i (c) $3 + i$
- (2) Soit z un nombre complexe ; $|z + i|$ est égal à :
 (a) $|z| + 1$ (b) $|z - 1|$ (c) $|i\bar{z} + 1|$
- (3) Soit z un nombre complexe non nul d'argument θ . Un argument de $\frac{-1 + i\sqrt{3}}{\bar{z}}$ est :
 (a) $-\frac{\pi}{3} + \theta$ (b) $\frac{2\pi}{3} + \theta$ (c) $\frac{2\pi}{3} - \theta$
- (4) Soit n un entier naturel. Le complexe $(\sqrt{3} + i)^n$ est un imaginaire pur si, et seulement si :
 (a) $n = 3$
 (b) $n = 6k + 3$, avec k relatif
 (c) $n = 6k$ avec k relatif
- (5) Soit A et B deux points d'affixe respective i et -1 . L'ensemble des points M d'affixe z vérifiant $|z - i| = |z + 1|$ est :
 (a) La droite (AB)
 (b) Le cercle de diamètre $[AB]$
 (c) La droite perpendiculaire à (AB) passant par O .
- (6) Soit Ω le point d'affixe $1 - i$. L'ensemble des points M d'affixe $z = x + iy$ vérifiant $|z - 1 + i| = |3 - 4i|$ a pour équation :
 (a) $y = -x + 1$
 (b) $(x - 1)^2 + y^2 = \sqrt{5}$
 (c) $z = 1 - i + 5e^{i\theta}$
- (7) Soient A et B les points d'affixes respectives 4 et $3i$. L'affixe du point C tel que le triangle ABC soit isocèle avec $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$ est :
 (a) $1 - 4i$ (b) $-3i$ (c) $7 + 4i$
- (8) L'ensemble des solutions dans $\mathcal{C}$ de l'équation $\frac{z-2}{z-1} = z$ est :
 (a) $\{1 - i\}$ (b) L'ensemble vide. (c) $\{1 - i ; 1 + i\}$

E.5964    Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. À tout point M d'affixe z du plan, on associe le point M' d'affixe z' par l'application f qui admet pour écriture complexe :

$$z' = \frac{(3 + 4i) \cdot z + 5\bar{z}}{6}$$

- (1) On considère les points A, B, C d'affixes respectives :
 $z_A = 1 + 2i$; $z_B = 1$; $z_C = 3i$
 Déterminer les affixes des points A', B', C' images respectives de A, B, C par f .
 Placer les points A, B, C, A', B', C' .
- (2) On pose $z = x + iy$ (avec x et y réels).
 Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z' en fonction de x et y .
- (3) Montrer que l'ensemble des points M invariants par f est la droite (D) d'équation $y = \frac{1}{2}x$.
 Tracer (D) . Quelle remarque peut-on faire?
- (4) Soit M un point quelconque du plan et M' son image par f . Montrer que M' appartient à la droite (D) .
- (5) (a) Montrer que, pour tout nombre complexe z :

$$\frac{z' - z}{z_A} = \frac{z + \bar{z}}{6} + i \cdot \frac{z - \bar{z}}{3}$$
 En déduire que le nombre $\frac{z' - z}{z_A}$ est un réel.
 (b) En déduire que, si $M' \neq M$, les droites (OA) et (MM') sont parallèles.
- (6) Un point quelconque N étant donné, comment construire son image N' ? (on étudiera deux cas suivant que N appartient ou non à (D)).
 Effectuer la construction sur la figure.

E.6085    Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Soit $A(1; 0)$ et $B(-1; 0)$.

À tout point M d'affixe $z \neq 0$, on associe le point M' d'affixe z' défini par : $z \times z' = 1$

- (1) (a) Construire M' quand : $z = 2(1 + i)$
 (b) Dans le cas général, montrer que la droite (AB) est bissectrice de l'angle $(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{OM'})$ et que :
 $OM \times OM' = OA^2$.
- (2) (a) Vérifier que :

$$\forall z \in \mathbb{C}^*, \left(\frac{z + z'}{2} - 1 \right) \left(\frac{z + z'}{2} + 1 \right) = \left(\frac{z - z'}{2} \right)^2$$
 (b) Soit I le milieu de $[MM']$. En utilisant (a) montrer que :
 $IA \times IB = IM^2$
 et que pour $M \neq A$ et $M \neq B$ la droite (MM') est bissectrice de l'angle $(\overrightarrow{IA}; \overrightarrow{IB})$

E.3857



Le plan complexe est rapporté à un repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé direct d'unité graphique: 4 cm.

On considère le point A d'affixe $z_A = 2 + i$ et le cercle (Γ) de centre A et de rayon $\sqrt{2}$.

- 1 Faire une figure qui sera complétée tout au long de l'exercice.
- 2
 - a Déterminer les affixes des points d'intersection de (Γ) et de l'axe $(O; \vec{u})$.
 - b On désigne par B et C les points d'affixes respectives $z_B = 1$ et $z_C = 3$. Déterminer l'affixe z_D du point D diamétralement opposé au point B sur le cercle (Γ) .
- 3 Soit M le point d'affixe $\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i$
 - a Calculer le nombre complexe: $\frac{z_D - z_M}{z_B - z_M}$.

4. Suites de complexes

E.6045



Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout entier naturel n , on note A_n le point d'affixe z_n défini par:

$$z_0 = 1 \quad ; \quad z_{n+1} = \left(\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right) \cdot z_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

On définit la suite (r_n) par:

$$r_n = |z_n| \quad \text{pour tout entier naturel } n.$$

- 1 Donner la forme exponentielle du nombre complexe: $\frac{3}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$.
- 2
 - a Montrer que (r_n) est géométrique de raison $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
 - b En déduire l'expression de r_n en fonction de n .
 - c Que dire de la longueur OA_n lorsque n tend vers $+\infty$?
- 3 On considère la fonction f d'un algorithme suivant:

Fonction $f(p)$

$r \leftarrow 1$

$n \leftarrow 0$

Tant que $r > p$

$n \leftarrow n + 1$

$r \leftarrow \frac{\sqrt{3}}{2}r$

Fin Tant que

Renvoyer n


- a Quelle est la valeur renvoyée par l'appel à la fonction f avec la valeur 0,5 pour l'argument p ?
- b Pour $p = 0,01$, on obtient $n = 33$. Quel est le rôle de cette fonction?
- 4
 - a Démontrer que le triangle $OA_n A_{n+1}$ est rectangle en A_{n+1} .
 - b On admet que: $z_n = r_n \cdot e^{i \frac{n\pi}{6}}$. Déterminer les valeurs de n pour lesquelles A_n est un point de l'axe des ordonnées.
 - c Compléter la figure donnée ci-dessous en représentant

- b Interpréter géométriquement l'argument du nombre $\frac{z_D - z_M}{z_B - z_M}$; en déduire que le point M appartient au cercle (Γ) .

- 4 On note (Γ') le cercle de diamètre $[AB]$. La droite (BM) recoupe le cercle (Γ') en un point N .
 - a Montrer que les droites (DM) et (AN) sont parallèles.
 - b Déterminer l'affixe du point N .
- 5 On désigne par M' l'image du nombre complexe z' vérifiant la relation: $\frac{z' - z_B}{z_M - z_B} = -i$
 - a Déterminer l'écriture algébrique du nombre complexe z' .
 - b Quelle est la nature du triangle $MM'B$?
 - c Montrer que le point M' appartient au cercle (Γ') .

les points A_6, A_7, A_8 et A_9 .

Les traits de construction seront apparents.



E.6900



On considère les nombres complexes z_n définis pour tout entier $n \geq 0$ par la donnée de z_0 , où z_0 est différent de 0 et de 1, et la relation de récurrence:

$$z_{n+1} = 1 - \frac{1}{z_n}$$

- 1
 - a Dans cette question, on suppose que $z_0 = 2$. Déterminer les nombres z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 et z_6 .
 - b Dans cette question, on suppose que $z_0 = i$. Déterminer la forme algébrique des nombres complexes z_1, z_2, z_3, z_4, z_5 et z_6 .
 - c Dans cette question, on revient au cas général où z_0 est un nombre complexe donné. Que peut-on conjecturer pour les valeurs prises par z_{3n} selon les valeurs de l'entier naturel n ?
Prouver cette conjecture.
- 2 Déterminer z_{2016} dans le cas où $z_0 = 1 + i$.
- 3 Existe-t-il des valeurs de z_0 tel que $z_0 = z_1$? Que peut-on dire de la suite (z_n) dans ce cas?

E.6904    On considère la suite (z_n) de nombres complexes définie pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} z_0 = 0 \\ z_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot i \times z_n + 5 \end{cases}$$

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on note M_n le point d'affixe z_n . On considère le nombre complexe $z_A = 4 + 2i$ et A le point du plan d'affixe z_A .

- 1 Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :
 $u_n = z_n - z_A$.

a Montrer que, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot i \times u_n$$

b Démontrer que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = \left(\frac{1}{2} \cdot i\right)^n \cdot (-4 - 2i)$$

- 2 Démontrer que, pour tout entier naturel n , les points A , M_n et M_{n+4} sont alignés.

E.5948    On considère la suite (z_n) à termes complexes définie par $z_0 = 1 + i$ et, pour tout entier naturel n , par :

$$z_{n+1} = \frac{z_n + |z_n|}{3}$$

Pour tout entier naturel n , on pose : $z_n = a_n + i \cdot b_n$, où a_n est la partie réelle de z_n et b_n est la partie imaginaire de z_n .
 Le but de cet exercice est d'étudier la convergence des suites (a_n) et (b_n) .

Partie A

- 1 Donner a_0 et b_0 .

- 2 Calculer z_1 , puis en déduire que : $a_1 = \frac{1+\sqrt{2}}{3}$; $b_1 = \frac{1}{3}$.

- 3 On considère la fonction f ci-dessous, extrait d'un algorithme, dont l'argument n est un entier naturel non-nul :

```

Fonction f(n)
  A ← 1
  B ← 1
  Pour K variant 1 à n
    A ←  $\frac{A + \sqrt{A^2 + B^2}}{3}$ 
    B ←  $\frac{B}{3}$ 
  Fin Pour
  Renvoyer A
    
```

- a On appelle cette fonction avec la valeur 2 pour l'argument n . Recopier et compléter le tableau ci-dessous contenant l'état des variables au cours de l'appel à cette fonction (on arrondira les valeurs calculées à 10^{-4} près).

K	A	B
1		
2		

- b Pour un nombre N donné, à quoi correspond la valeur renvoyée par la fonction f par rapport à la situation étudiée dans cet exercice?

Partie B

- 1 Pour tout entier naturel n , exprimer z_{n+1} en fonction de a_n et b_n .

En déduire l'expression de a_{n+1} en fonction de a_n et b_n , et l'expression de b_{n+1} en fonction de a_n et b_n .

- 2 Quelle est la nature de la suite (b_n) ? En déduire l'expression de b_n en fonction de n , et déterminer la limite de (b_n) .

- 3 a On rappelle que pour tous nombres complexes z et z' :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'| \quad (\text{inégalité triangulaire}).$$

Montrer que pour tout entier naturel n :

$$|z_{n+1}| \leq \frac{2|z_n|}{3}$$

- b Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = |z_n|$. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n \cdot \sqrt{2}$$

En déduire que la suite (u_n) converge vers une limite que l'on déterminera.

- c Montrer que, pour tout entier naturel n , $|a_n| \leq u_n$. En déduire que la suite (a_n) converge vers une limite que l'on déterminera.

E.3170    Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On prendra pour unité graphique 5 cm.

On pose $z_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n$.
 On note A_n le point du plan d'affixe z_n .

- 1 Calculer z_1 , z_2 , z_3 , z_4 et vérifier que z_4 est un nombre réel.
 Placer les points A_0 , A_1 , A_2 , A_3 et A_4 sur une figure.

- 2 Pour tout entier naturel n , on pose : $u_n = |z_n|$. Justifier que la suite (u_n) est une suite géométrique puis établir que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = 2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n$$

- 3 À partir de quel rang n_0 tous les points A_n appartiennent-ils au disque de centre O et de rayon 0,1?

- 4 a Établir que, pour tout entier naturel n :
 $\frac{z_{n+1} - z_n}{z_{n+1}} = i$.

En déduire la nature du triangle $OA_n A_{n+1}$.

- b Pour tout entier naturel n , on note ℓ_n la longueur de la ligne brisée $A_0 A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n$.
 On a ainsi : $\ell_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n$.
 Exprimer ℓ_n , en fonction de n . Quelle est la limite de la suite (ℓ_n) ?

E.6255




On définit, pour tout entier naturel n , les nombres complexes z par :

$$\begin{cases} z_0 = 16 \\ z_{n+1} = \frac{1+i}{2} \cdot z_n \end{cases} \text{ pour tout entier naturel } n.$$

On note r_n le module du nombre complexe z_n : $r_n = |z_n|$. Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct d'origine O , on considère les points A_n d'affixes z_n .

- 1 a Calculer z_1 , z_2 et z_3 .
- b Placer les points A_1 et A_2 sur le graphique donné ci-dessous.



- c Écrire le nombre complexe $\frac{1+i}{2}$ sous forme trigonométrique.
 - d Démontrer que le triangle OA_0A_1 est isocèle rectangle en A_1 .
- 2 Démontrer que la suite (r_n) est géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
La suite (r_n) est-elle convergente?
Interpréter géométriquement le résultat précédent.

On note I_n la longueur de la ligne brisée qui relie le point A_0 au point A_n en passant successivement par les points $A_1, A_2, A_3 \dots$

Ainsi :
$$L_n = \sum_{i=0}^{n-1} A_i A_{i+1} = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n$$

- 3 a Démontrer que pour tout entier naturel n : $A_n A_{n+1} = r_{n+1}$
- b Donner une expression de L_n en fonction de n .
- c Déterminer la limite éventuelle de la suite (L_n) .

E.6349



Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct.

On considère l'équation :

$$(E): z^2 - 2z \cdot \sqrt{3} + 4 = 0$$

- 1 Résoudre l'équation (E) dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes.
- 2 On considère la suite (M_n) des points d'affixes définie pour $n \geq 1$ par : $z_n = 2^n \cdot e^{i \cdot (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6}}$.
 - a Vérifier que z_1 est une solution de (E) .
 - b Écrire z_2 et z_3 sous forme algébrique.
 - c Placer les points M_1, M_2, M_3 et M_4 sur la figure donnée ci-dessous et tracer les segments $[M_1 M_2]$, $[M_2 M_3]$ et $[M_3 M_4]$.


- 3 Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$z_n = 2^n \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{(-1)^n \cdot i}{2} \right).$$

- 4 Calculer les longueurs $M_1 M_2$ et $M_2 M_3$.

Pour la suite de l'exercice, on admet que, pour tout entier $n \geq 1$: $M_n M_{n+1} = 2^n \cdot \sqrt{3}$.

- 5 On note $\ell_n = M_1 M_2 + M_2 M_3 + \dots + M_n M_{n+1}$.
 - a Montrer que, pour tout entier naturel $n \geq 1$: $\ell_n = 2\sqrt{3} \cdot (2^n - 1)$.
 - b Déterminer le plus petit entier n tel que : $\ell_n \geq 1000$.




E.6937



On considère les nombres complexes z_n définis, pour tout entier naturel n , par :

$$z_0 = 1 \quad ; \quad z_{n+1} = \left(1 + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cdot z_n$$

On note A_n le point d'affixe z_n dans le repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ orthonormé donné ci-dessous :



L'objet de cet exercice est d'étudier la construction des points A_n .

- 1 a Vérifier que : $1 + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot e^{i\frac{\pi}{6}}$
 - b En déduire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.
- 2 a Montrer que pour tout entier naturel n :

$$z_n = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n \cdot e^{i \cdot n \cdot \frac{\pi}{6}}$$
 - b Pour quelles valeurs de n , les points O , A_0 et A_n sont-ils alignés?
- 3 Pour tout entier naturel n , on pose : $d_n = |z_{n+1} - z_n|$.
 - a Interpréter géométriquement d_n .
 - b Calculer d_0 .
 - c Montrer que pour tout entier naturel n non nul :

$$z_{n+2} - z_{n+1} = \left(1 + i \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cdot (z_{n+1} - z_n).$$
 - d En déduire que la suite (d_n) est géométrique puis, que pour tout entier naturel n :

$$d_n = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n$$
- 4 a Montrer que pour tout entier naturel n :

$$|z_{n+1}|^2 = |z_n|^2 + d_n^2$$
 - b En déduire que, pour tout entier naturel n , le triangle OA_nA_{n+1} est rectangle en A_n .
 - c Construire, à la règle non graduée et au compas, le point A_5 sur la figure ci-dessus.
 - d Justifier cette construction.

E.6941



On veut modéliser dans le plan la coquille d'un nautilus à l'aide d'une ligne brisée en forme de spirale. On s'intéresse à l'aire délimitée par cette ligne.


On munit le plan d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Pour tout entier k allant de 0 à n , on définit les nombres complexes :

$$z_k = \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot e^{i \frac{2k\pi}{n}}$$

et on note M_k le point d'affixe z_k .

Dans ce modèle, le pourtour du nautilus est la ligne brisée reliant tous les points M_k avec $0 \leq k \leq n$.

Par exemple, pour les entiers $n=6$, $n=10$ et $n=20$, on obtient les figures ci-dessous :



Partie A : Ligne brisée formée à partir de sept points

Dans cette partie, on suppose que $n=6$. Ainsi, pour $0 \leq k \leq 6$,

$$\text{on a : } z_k = \left(1 + \frac{k}{6}\right) \cdot e^{i \frac{2k\pi}{6}}$$

- 1 Déterminer la forme algébrique de z_1 .
- 2 Vérifier que z_0 et z_6 sont des entiers que l'on déterminera.
- 3 Calculer la longueur de la hauteur issue de M_1 dans le triangle OM_0M_1 puis établir que l'aire de ce triangle est égale à $\frac{7\sqrt{3}}{24}$.

Partie B : Ligne brisée formée à partir de $n+1$ points

Dans cette partie, n est un entier supérieur ou égal à 2.

- 1 Pour tout entier k tel que $0 \leq k \leq n$, déterminer la longueur OM_k .
- 2 Pour k entier tel que $0 \leq k \leq n-1$, déterminer une mesure des angles $(\vec{u}; \overrightarrow{OM_k})$ et $(\vec{u}; \overrightarrow{OM_{k+1}})$.
En déduire une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OM_k}; \overrightarrow{OM_{k+1}})$.
- 3 Pour k entier tel que $0 \leq k \leq n-1$, démontrer que la longueur de la hauteur issue de M_{k+1} dans le triangle OM_kM_{k+1} est égale à $\left(1 + \frac{k+1}{n}\right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$.
- 4 On admet que l'aire du triangle OM_kM_{k+1} est égale à :

$$a_k = \frac{1}{2} \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{k}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{k+1}{n}\right)$$
 et que l'aire totale délimitée par la ligne brisée est égale à : $A_n = a_0 + a_1 + \dots + a_{n-1}$

On considère la fonction f d'un algorithme donnée ci-dessous, prenant pour argument un entier n et renvoyant la valeur de la variable A correspondant à l'aire A_n correspondant au rang n :

```

Fonction f(n)
  A ← 0
  Pour k allant de 0 à n-1
    A ← A + 1/2 * sin(2π/n) * (1 + k/n) * (1 + (k+1)/n)
  Fin Pour
  Renvoyer A

```

On appelle la fonction f avec la valeur 10 pour l'argument n .

Recopier et compléter le tableau ci-dessous qui recueille toutes les valeurs prises les variables k et A lors de l'appel à la fonction f .

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	0,323	0,711	1,170	1,705	2,322	3,027	3,826	4,726		

- 5 On admet que $A_2=0$ et que la suite (A_n) converge et que: $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \frac{7\pi}{3} \approx 7,3$

Recopier et compléter la ligne $\ell.3$ afin qu'à la fin de son

exécution, la valeur de la variable n représentant le plus petit entier n tel que $A_n \geq 7,2$. On ne demande pas de déterminer n

```

ℓ.1  n ← 2
ℓ.2  1 ← 0
ℓ.3  Tant que ...
ℓ.4      n ← n+1
ℓ.5      A ← 0
ℓ.6      Pour k allant de 0 à n-1
ℓ.7          A ← A + 1/2 * sin(2π/n) * (1 + k/n) * (1 + (k+1)/n)
ℓ.8      Fin Pour
ℓ.9  Fin tant que

```

5. Transformation du plan

E.3141    Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On prendra pour unité graphique 1 cm.

- 1 Question de cours
On rappelle que: "Pour tout vecteur $\vec{w}$ non nul, d'affixe z , on a:

$$|z| = \|\vec{w}\| \text{ et } \arg(z) = \left(\vec{u}; \vec{w} \right).$$

Soient M , N et P trois points du plan, d'affixes respectives m , n et p tels que $m \neq n$ et $m \neq p$.

- a Démontrer que: $\arg\left(\frac{p-m}{n-m}\right) = \left(\overrightarrow{MN}; \overrightarrow{MP} \right)$.
- b Interpréter géométriquement le nombre $\left| \frac{p-m}{n-m} \right|$.
- 2 On considère les points A , B , C et D d'affixes respectives:
 $z_1 = 4+i$; $z_B = 1+i$; $z_C = 5i$; $z_D = -3-i$
Placer ces points sur une figure.
- 3 Soit f l'application du plan dans lui-même qui, à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que:
 $z' = (1+2i)z - 2 - 4i$
- a Préciser les images des points A et B par f .
- b Montrer que f admet un unique point invariant Ω dont on précisera l'affixe ω .
- 4 a Montrer que pour tout nombre complexe z , on a:
 $z' - z = -2i(2-i-z)$
- b En déduire, pour tout point M différent du point Ω , la valeur de $\frac{MM'}{\Omega M}$ et une mesure en radians de l'angle $\left(\overrightarrow{M\Omega}; \overrightarrow{MM'} \right)$.
- c Quelle est la nature du triangle $\Omega MM'$?
- d Soit E le point d'affixe $z_E = -1-i\sqrt{3}$. Écrire z_E sous forme exponentielle puis placer le point E sur la figure. Réaliser ensuite la construction du point E' associé au point E .

E.3166    Le complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On prendra pour unité graphique 2 cm. Soit f l'application qui, à tout point M du plan d'affixe z non nulle, associe le point M' d'affixe z' telle que $z' = \frac{4}{\bar{z}}$, où $\bar{z}$ désigne le nombre complexe conjugué de z .

- 1 Déterminer l'ensemble des points invariants par f .
- 2 Déterminer l'ensemble des points dont l'image par l'application f est le point J d'affixe 1.
- 3 Soit α un nombre complexe non nul. Démontrer que le point A d'affixe α admet un antécédent unique par f , dont on précisera l'affixe.
- 4 a Donner une mesure de l'angle $\left(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{OM'} \right)$. Interpréter géométriquement ce résultat.
- b Exprimer $|z'|$ en fonction de $|z|$. Si r désigne un réel strictement positif, en déduire l'image par f du cercle de centre O et de rayon r .
- c Choisir un point P du plan complexe non situé sur les axes de coordonnées et tel que $OP=3$, et construire géométriquement son image P' par f .
- 5 On considère le cercle $\mathcal{C}_1$, de centre J et de rayon 1. Montrer que l'image par f de tout point de $\mathcal{C}_1$, distinct de O , appartient à la droite D d'équation $x=2$.

E.3160



Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ (unité graphique 3 cm).

À tout point M d'affixe z du plan, on associe le point M' d'affixe z' par l'application f qui admet pour écriture complexe :

$$z' = \frac{(3 + 4i)z + 5\bar{z}}{6}$$

- 1 On considère les points A, B, C d'affixes respectives :
 $z_A = 1 + 2i$; $z_B = 1$; $z_C = 3i$.
 Déterminer les affixes des points A', B', C' images respectives de A, B, C par f .
 Placer les points A, B, C, A', B', C' .
- 2 On pose $z = x + iy$ (avec x et y réels).
 Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z' en fonction de x et y .
- 3 Montrer que l'ensemble des points M invariants par f est la droite (D) d'équation $y = \frac{1}{2}x$.
 Tracer (D) . Quelle remarque peut-on faire?
- 4 Soit M un point quelconque du plan et M' son image par f . Montrer que M' appartient à la droite (D) .
- 5 a Montrer que, pour tout nombre complexe z :

$$\frac{z' - z}{z_A} = \frac{z + \bar{z}}{6} + i \frac{z - \bar{z}}{3}$$
 En déduire que le nombre $\frac{z' - z}{z_A}$ est réel.
 b En déduire que, si $M' \neq M$, les droites (OA) et (MM') sont parallèles.
- 6 Un point quelconque N étant donné, comment construire son image N' ? (on étudiera deux cas suivant que N appartient ou non à (D)).
 Effectuer la construction sur la figure.

E.3185



Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ (unité graphique 2 cm).

On rappelle que pour tout vecteur $\vec{w}$ non nul, d'affixe z , on a :

$$|z| = \|\vec{w}\| \quad ; \quad \arg(z) = (\vec{u}; \vec{w}) \text{ à } 2\pi \text{ près.}$$

Partie A. Restitution organisée de connaissances

Prérequis : on sait que si z et z' sont deux nombres complexes non nuls, alors :

$$\arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z')$$

Soient z et z' deux nombres complexes non nuls. Démontrer que :

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')$$

Partie B

On note A et B les points d'affixes respectives $-i$ et $3i$.

On note f l'application qui, à tout point M du plan, d'affixe z , distant de A , associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = \frac{iz + 3}{z + i}$$

- 1 a Démontrer que f admet deux points invariants J et K appartenant au cercle de diamètre $[AB]$.
 Placer ces points sur le dessin.
 b On note C le point d'affixe $c = -2 + i$. Démontrer que le point C' , image de C par f , appartient à l'axe des abscisses.
- 2 Pour tout point M du plan distinct de A et de B , démontrer que :

$$\arg(z') = (\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) + \frac{\pi}{2} \text{ à } 2\pi \text{ près.}$$
- 3 Étude deux ensembles de points.
 - a Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que z' soit un nombre complexe imaginaire pur.
 - b Soit M d'affixe z un point du cercle de diamètre $[AB]$ privé des points A et B . À quel ensemble appartient le point M'

E.3197



On considère le plan complexe $\mathcal{P}$ rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

Dans tout l'exercice, $\mathcal{P} \setminus \{0\}$ désigne le plan $\mathcal{P}$ privé du point origine O .

1 Question de cours

On prend comme prérequis les résultats suivants :

- Si z et z' sont deux nombres complexes non nuls, alors :
 $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z')$ à $2k\pi$ près,
 avec k entier relatif.

- Pour tout vecteur $\vec{w}$ non nul d'affixe z , on a :
 $\arg(z) = \arg(\vec{w})$ à $2k\pi$ près,
 avec k entier relatif.

- a) Soit z et z' des nombres complexes non nuls, démontrer que :

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') \text{ à } 2k\pi \text{ près, avec } k \text{ entier relatif.}$$

- b) Démontrer que si A, B, C sont trois points du plan, deux à deux distincts, d'affixes respectives a, b, c , on a :

$$\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = \arg(\vec{AB}; \vec{AC}) \text{ à } 2k\pi \text{ près, avec } k \text{ entier relatif.}$$

- 2) On considère l'application f de $\mathcal{P} \setminus \{0\}$ qui, au point M du plan d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' , associe le point M' d'affixe z' définie par :

$$z' = \frac{1}{\bar{z}}$$

- a) Démontrer que pour $z \neq 0$, on a :

$$\arg(z') = \arg(z) \text{ à } 2k\pi \text{ près, avec } k \text{ entier relatif.}$$

En déduire que, pour tout point M de $\mathcal{P} \setminus \{0\}$ les points M et $M' = f(M)$ appartiennent à une même demi-droite d'origine O .

- b) Déterminer l'ensemble des points M de $\mathcal{P} \setminus \{0\}$ tels que : $f(M) = M$.

- c) M est un point du plan $\mathcal{P}$ distinct de O, U et V , on admet que M' est aussi distinct de O, U et V .

$$\text{Établir l'égalité : } \frac{z' - 1}{z' - i} = \frac{1}{i} \left(\frac{\bar{z} - 1}{\bar{z} + i} \right) = -i \left(\frac{z - 1}{z - i} \right)$$

En déduire une relation entre $\arg\left(\frac{z' - 1}{z' - i}\right)$ et $\arg\left(\frac{z - 1}{z - i}\right)$.

- 3) a) Soit z un nombre complexe tel que $z \neq 1$ et $z \neq i$ et soit M le point d'affixe z . Démontrer que M est sur la droite (UV) privée de U et de V si, et seulement si, $\frac{z-1}{z-i}$ est un nombre réel non nul.

- b) Déterminer l'image par f de la droite (UV) privée de U et de V .

E.3816



Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, unité graphique 2 cm .

On appelle A le point d'affixe $-2i$. À tout point M du plan d'affixe z , on associe le point M' d'affixe :

$$z' = -2\bar{z} + 2i$$

- 1) On considère le point B d'affixe $b = 3 - 2i$. Déterminer la forme algébrique des affixes a' et b' des points A' et B' associés respectivement aux points A et B . Placer ces points sur le dessin.

- 2) Montrer que si M appartient à la droite (Δ) d'équation $y = -2$ alors M' appartient aussi à (Δ) .

- 3) Démontrer que pour tout point M d'affixe z , on a :
 $|z' + 2i| = 2|z + 2i|$

E.3212



Soit $\mathcal{P}$ le plan complexe rapporté au repère $(O; \vec{u}; \vec{v})$ (unité graphique 4 cm). Soit A le point d'affixe 1. On note f l'application de $\mathcal{P}$ privé de A dans $\mathcal{P}$ qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = \frac{1}{z - 1}$$

- 1) a) Soit B le point d'affixe $b = 4 + i\sqrt{3}$. Déterminer la forme algébrique et la forme exponentielle de l'affixe b' de B' .

- b) Déterminer les affixes des points ayant pour image par f leur symétrique par rapport à O .

- 2) a) Exprimer $|z'|$ et $\arg(z')$ en fonction de $|z - 1|$ et $\arg(z - 1)$.

- b) Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre A et de rayon r . On suppose que M est un point de $\mathcal{C}$. Déterminer $|z'|$. En déduire que M' appartient à un cercle $\mathcal{C}'$ dont on précisera le centre et le rayon.

- c) Placer un point M quelconque sur le cercle de centre A et de rayon $\frac{1}{2}$ et construire son image M' . (on laissera les traits de construction).

E.3874



Dans le plan complexe ($\mathcal{P}$) muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$ d'unité graphique 4 cm, on considère le point A d'affixe $A = -1$ et l'application f , du plan ($\mathcal{P}$) dans lui-même, qui au point M , d'affixe z distinct de A , associe le point $M' = f(M)$ d'affixe z' tel que :

$$z' = \frac{i \cdot z}{z + 1}$$

- 1 Déterminer l'affixe des points M tels que $M' = M$.
- 2 Démontrer que pour tout point M distinct de A et de O , on a :

$$OM' = \frac{OM}{AM}$$

$$\left(\vec{u}; \overrightarrow{OM'} \right) = \left(\vec{MA}; \overrightarrow{MO} \right) + \frac{\pi}{2} \text{ à } 2\pi \text{ près}$$

- 3
 - a Soit B le point d'affixe $b = -\frac{1}{2} + i$.
Placer dans le repère le point B et la médiatrice (Δ) du segment $[OA]$.
 - b Calculer sous forme algébrique l'affixe b' du point B' image du point B par f .
Établir que B' appartient au cercle ($\mathcal{C}$) de centre O et de rayon 1.
Placer le point B' et tracer le cercle ($\mathcal{C}$) dans le repère.
 - c En utilisant la question 2, démontrer que, si un point M appartient à la médiatrice (Δ), son image M' par f appartient au cercle ($\mathcal{C}$).
 - d Soit C le point tel que le triangle AOC soit équilatéral direct.
En s'aidant des résultats de la question 2, construire, à la règle et au compas, l'image du point C par f (On laissera apparents les traits de construction).
- 4 Dans cette question, on se propose de déterminer, par deux méthodes différentes, l'ensemble (Γ) des points M distincts de A et de O dont l'image M' par f appartient à l'axe des abscisses.

Les questions a et b peuvent être traitées de façon indépendante.

- a On pose $z = x + i \cdot y$ avec x et y réels tels que :
 $(x; y) \neq (-1; 0)$; $(x; y) \neq (0; 0)$
Démontrer que la partie imaginaire de z' est égale à :
$$Im(z') = \frac{x^2 + y^2 + x}{(x + 1)^2 + y^2}$$

En déduire la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble (Γ) et le tracer dans le repère.
- b À l'aide de la question 2, retrouver géométriquement la nature de l'ensemble (Γ).

E.4072



La feuille annexe donnée portera les constructions demandées au cours de l'exercice.

Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, le point A a pour affixe i .

On note f l'application qui, à tout point M d'affixe z avec $z \neq i$ associe le point M' d'affixe z' telle que :

$$z' = \frac{-z^2}{z - i}$$

Le but de l'exercice est de construire géométriquement le point M' connaissant le point M

1 Un exemple

On considère le point K d'affixe $1 + i$.

- a Placer le point K .
- b Déterminer l'affixe du point K' image de K par f .
- c Placer le point K' .

2 Des points pour lesquels le problème ne se pose pas

- a On considère le point L d'affixe $\frac{i}{2}$. Déterminer son image L' par f . Que remarque-t-on?
- b Un point est dit invariant par f s'il est confondu avec son image.
Démontrer qu'il existe deux points invariants par f dont on déterminera les affixes.

3 Un procédé de construction


On nomme G l'isobarycentre des points A , M et M' et g l'affixe de G .

- a Vérifier l'égalité : $g = \frac{1}{3 \cdot (z - i)}$.
- b En déduire que :
Si M est un point du cercle de centre A de rayon r , alors G est un point du cercle de centre O de rayon $\frac{1}{3 \cdot r}$.
- c Démontrer que : $\arg(g) = -\left(\vec{u}; \overrightarrow{AM} \right)$.
- d Sur la feuille annexe, on a marqué un point D sur le cercle de centre A et de rayon $\frac{1}{2}$.
On nomme D' l'image de D par f . Déduire des questions précédentes la construction du point D' et la réaliser sur la figure annexe à rendre avec la copie).

Sur la figure ci-dessous le segment $[OI]$ tel que :

$$\vec{u} = \overrightarrow{OI}$$

est partagé en six segments d'égale longueur.



E.4030    Le plan complexe P est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$, unité graphique 2 cm . On appelle Γ le cercle de centre O et de rayon 1.

On fera une figure que l'on complètera tout au long de l'exercice.

On appelle F l'application du plan P privé du point O dans P qui, à tout point M différent de O , d'affixe z , associe le point $M' = F(M)$ d'affixe z' définie par :

$$z' = z + i - \frac{1}{z}$$

- 1 On considère les points A et B d'affixes respectives $a = i$ et $b = e^{i \cdot \frac{\pi}{6}}$ et leurs images A' et B' par F d'affixes respectives a' et b' .
 - a Calculer a' et b' .
 - b Placer les points A , A' , B et B' .
 - c Démontrer que : $\frac{-b}{b' - b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot i$.
 - d En déduire la nature du triangle OBB' .
- 2 On recherche l'ensemble (E) des points du plan P privé du point O qui ont pour image par F , le point O .
 - a Démontrer que, pour tout nombre complexe z :

$$z^2 + i \cdot z - 1 = \left(z + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot \left(z - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot i\right)$$
 - b En déduire les affixes des points de l'ensemble (E) .
 - c Démontrer que les points de (E) appartiennent à (Γ) .
- 3 Soit θ un réel.
 - a Démontrer que si $z = e^{i \cdot \theta}$ alors $z' = (2 \cdot \sin \theta + 1) \cdot i$
 - b En déduire que si M appartient au cercle (Γ) alors M' appartient au segment $[A'C]$ où C a pour affixe $-i$.

6. Exercices non-classés

E.8135   

- 1 Donner les formes exponentielle et trigonométrique des nombres complexes $1+i$ et $1-i$.
- 2 Pour tout entier naturel n , on a posé :

$$S_n = (1+i)^n + (1-i)^n$$
 - a Déterminer la forme trigonométrique de S_n .
 - b Pour chacune des deux affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée ne sera pas prise en compte et l'absence de réponse n'est pas pénalisée
 - **Affirmation A :** Pour tout entier naturel n , le nombre complexe S_n est un nombre réel.
 - **Affirmation B :** Il existe une infinité d'entiers naturels n tels que $S_n = 0$.

E.8145    Asie Juin 2018

E.8148    Antilles Guyanes septembre 2018

E.3151



Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Le candidat indiquera sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.

Chaque réponse exacte rapporte 1 point, chaque réponse fausse enlève 0,5 point. Une absence de réponse est comptée 0 point. Si le total est négatif, la note est ramenée à zéro. Aucune justification n'est demandée.

1 Soit z le nombre complexe de module $\sqrt{2}$ et d'argument $\frac{\pi}{3}$. On a alors :

a $z^{14} = -128\sqrt{3} - 128i$ b $z^{14} = 64 - 64i$

c $z^{14} = -64 + 64i\sqrt{3}$ d $z^{14} = -128 + 128i\sqrt{3}$

2 On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé, le point S d'affixe 3 et le point T d'affixe $4i$. Soit (E) l'ensemble des points M d'affixe z tels que : $|z - 3| = |3 - 4i|$.

a (E) est la médiatrice du segment $[ST]$;

b (E) est la droite (ST) ;

c (E) est le cercle de centre Ω d'affixe $3 - 4i$ et de rayon 3 ;

d (E) est le cercle de centre S et de rayon 5

3 On considère un hexagone régulier $ABCDEF$, dont les côtés sont de longueur 1. Le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CF}$ est égal à :

a $\sqrt{3}$ b -3 c $-\sqrt{3}$ d $\frac{3}{2}$

4 Une fonction g est définie sur l'intervalle $]-\infty; 0]$ par $g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{x - 3}$; soit Γ sa courbe représentative dans un repère du plan.

a Γ admet une asymptote d'équation $y = -1$.

b Γ n'admet pas d'asymptote.

c Γ admet une asymptote d'équation $y = x$.

d Γ admet une asymptote d'équation $y = 1$.

5 Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$. La fonction f'' , dérivée seconde de la fonction f sur $\mathbb{R}$, est définie par :

a $f''(x) = \int_0^x -2t \cdot e^{-t^2} dt$ b $f''(x) = \int_0^x -2x \cdot e^{-x^2} dx$

c $f''(x) = -2x \cdot e^{-x^2}$ d $f''(x) = e^{-x^2}$

E.6048



Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Aucune justification n'est demandée. Pour chacune des questions, une seule des quatre propositions est exacte. Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse erronée ou une absence de réponse n'ôte pas de point. Le candidat indiquera sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie.

1 Soit $z_1 = \sqrt{6} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $z_2 = \sqrt{2} \cdot e^{-i\frac{\pi}{3}}$. La forme exponentielle de $i \cdot \frac{z_1}{z_2}$ est :

a $\sqrt{3}e^{i\frac{19\pi}{12}}$ b $\sqrt{12}e^{-i\frac{\pi}{12}}$ c $\sqrt{3} \cdot e^{i\frac{7\pi}{12}}$ d $\sqrt{3}e^{i\frac{13\pi}{12}}$

2 L'équation $-z = \bar{z}$, d'inconnue complexe z , admet :

a une solution

b deux solutions

c une infinité de solutions dont les points images dans le plan complexe sont situés sur une droite.

d une infinité de solutions dont les points images dans le plan complexe sont situés sur un cercle.

3 Dans un repère de l'espace, on considère les trois points $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 5; 4)$ et $C(-1; 0; 4)$. La droite parallèle à la droite (AB) passant par le point C a pour représentation paramétrique :

a $\begin{cases} x = -2t - 1 \\ y = 3t \\ z = t + 4 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ b $\begin{cases} x = -1 \\ y = 7t \\ z = 7t + 4 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

c $\begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = 4 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ d $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

4 Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le plan $\mathcal{P}$ passant par le point $D(-1; 2; 3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3; -5; 1)$, et la droite Δ de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t - 7 \\ y = t + 3 \\ z = 2t + 5 \end{cases}, \text{ pour tout } t \in \mathbb{R}$$

a La droite Δ est perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$.

b La droite Δ est parallèle au plan $\mathcal{P}$ et n'a pas de point commun avec le plan $\mathcal{P}$.

c La droite Δ et le plan $\mathcal{P}$ sont sécants.

d La droite Δ est incluse dans le plan $\mathcal{P}$.

E.6051



Les quatre questions de cet exercice sont indépendantes.

Pour chaque question, une affirmation est proposée. Indiquer si chacune d'elles est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point.

Dans les questions 1 et 2, le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$. On considère les points A, B, C, D et E d'affixes respectives :

$$a = 2 + 2i \quad ; \quad b = -\sqrt{3} + i \quad ; \quad c = 1 + i\sqrt{3}$$

$$d = -1 + \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad ; \quad e = -1 + (2 + \sqrt{3})i$$


- 1 **Affirmation 1 :** les points A, B et C sont alignés.
- 2 **Affirmation 2 :** les points B, C et D appartiennent à un même cercle de centre E .
- 3 Dans cette question, l'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.
On considère les points :
 $J(0; 1; 0) \quad ; \quad K(0; 0; 1)$

Affirmation 3 : la droite $\mathcal{D}$ de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 6 - 2t \\ z = -2 + t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}$$

coupe le plan (IJK) au point $E\left(-\frac{1}{2}; 1; \frac{1}{2}\right)$

- 4 Dans le cube $ABCDEFGH$, le point T est le milieu du segment $[HF]$.



Affirmation 4 : les droites (AT) et (EC) sont orthogonales.

nales.

E.8138



Pour chacune des quatre affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant la réponse. Il est attribué un point par réponse exacte correctement justifiée. Une réponse inexacte ou non justifiée ne rapporte ni n'enlève aucun point.

- 1 Un type d'oscilloscope a une durée de vie, exprimée en année, qui peut être modélisée par une variable aléatoire D qui suit une loi exponentielle de paramètre λ .

On sait que la durée de vie moyenne de ce type d'oscilloscope est de 8 ans.

Affirmation 1 : pour un oscilloscope de ce type choisi au hasard et ayant déjà fonctionné 3 ans, la probabilité que la durée de vie soit supérieure ou égale à 10 ans, arrondie au centième, est égale à 0,42.

On rappelle que si $\mathcal{X}$ est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre λ , on a pour tout réel t positif : $\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq t) = 1 - e^{-\lambda \cdot t}$

- 2 En 2016, en France, les forces de l'ordre ont réalisé 9,8 millions de dépistages d'alcoolémie auprès des automobilistes, et 3,1 % de ces dépistages étaient positifs.

Source OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies)

Dans une région donnée, le 15 juin 2016, une brigade de gendarmerie a effectué un dépistage sur 200 automobilistes.

Affirmation 2 : en arrondissant au centième, la probabilité que, sur les 200 dépistages, il y ait eu strictement plus de 5 dépistages positifs, est égale à 0,59.

- 3 On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation :
 $\ln(6x-2) + \ln(2x-1) = \ln(x)$

Affirmation 3 : l'équation admet deux solutions dans l'intervalle $\left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$.

- 4 On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :
 $(4z^2 - 20z + 37)(2z - 7 + 2i) = 0$

Affirmation 4 : les solutions de l'équation sont les affixes de points appartenant à un même cercle de centre le point P d'affixe 2.